11 класс

11.1. . Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих неравенству $\sqrt{x^2-2xy}>\sqrt{1-y^2}$

Решение. Данное неравенство равносильно системе: $\begin{cases} x^2-2xy>1-y^2 \\ 1-y^2\ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-y)^2>1 \\ |y|\le 1 \end{cases} \Leftrightarrow$ либо $\begin{cases} x-y>1 \\ |y|\le 1 \end{cases}$, либо $\begin{cases} x-y<-1 \\ |y|\le 1 \end{cases}$.

Решение совокупности данных двух систем изображено на рисунке.



11.2. Найдите все значения параметра *a*, для которых уравнение $\sqrt{1-x^2}=ax+2$ имеет ровно один корень..

Ответ: $a=\pm\sqrt{3};\ |a|>2$. **Решение**. См. задачу 10.2.

11.3. В треугольнике *ABC* проведена медиана *BM*. Можно ли утверждать, что треугольник *ABC* равнобедренный, если известно, что **а)** $R_{ABM}=R_{CBM}$; **б)** $r_{ABM}=r_{CBM}$, где *R* и *r* – радиусы описанной и вписанной окружностей соответствующих треугольников?

Ответ: **а)** можно. **б)** можно. **Решение**. См. задачу 10.3.

11.4. .Дана последовательность $a_1=\cos 10°$, $a_2=\cos 100°,\ldots,$ $a_n=\cos(10^n)°$ (градусов). **а)** Определите знак числа a_{100}; **б)** Докажите, что $|a_{100}|<0{,}18$.

Ответ: **а)** $a_{100}>0$. **Решение**. Покажем, что начиная с третьего члена последовательность становится постоянной: $a_3=a_4=a_5=\ldots=a_{100}$. Действительно, при $n\ge 3$: $10^{n+1}-10^n=9\cdot 10^3\cdot 10^{n-3}=\ =360\cdot 25\cdot 10^{n-3}$, т.е. углы отличаются на величину, кратную 360°. Таким образом, нетрудно определить знак $\cos 1000°=\cos(360°\cdot 3-80°)$ = $\cos 80°=\sin 10°>0$. **б)** Воспользуемся известным неравенством $\sin x<x$ при всех $x>0$ (здесь *x* – угол в радианах). (Это неравенство обычно доказывается при выводе первого замечательного предела; другой способ доказательства – рассмотреть функцию $y=x-\sin x$, которая возрастает, т.к. $y'=1-\cos x\ge 0$ и $y(0)=0$.) Таким образом, $0<\sin 10°=\sin\frac{10}{180}\pi<\frac{\pi}{18}<0{,}18$; т.к. $18\cdot 0{,}18=3{,}24>\pi$

11.5. Дано число $N=1^{25}+2^{25}+\ldots+24^{25}$. Найдите **а)** две последние цифры числа *N*; **б**) четыре его последние цифры.

Ответ: **а)** два нуля; **б)** четыре нуля. **Решение. а**) см. задачу 10.5**. б)** Докажем, что *N* делится на 10^4. Делимость на 5^4 докажем, используя бином Ньютона: имеем $1^{25}+24^{25}=1+(-1+25)^{25}=1-1+25\cdot 25-C_{25}^2(25)^2+C_{25}^3(25)^3-\ldots+25^{25}$. Эта сумма,

очевидно, делится на 25^2. Аналогично, на 25^2 делятся суммы вида $k^{25}+(25-k)^{25}$ для $k=1,2,...,12$. Делимость на 16 получим с помощью формулы (*) (см. задачу 10.5). Применим её для 6 пар нечетных слагаемых $1^{25}+23^{25}, 3^{25}+21^{25},...,11^{25}+13^{25}$. Для каждой такой пары первая скобка в правой части (*) (см. решение задачи 10.5) равна 24, а вторая скобка представляет собой сумму (с чередующимися знаками) двадцати пяти нечетных чисел, т.е. число нечетное. Поэтому сумма всех этих шести пар равна произведению 24 на сумму шести нечетных чисел, и значит, делится на $24\cdot 2=16\cdot 3$ Таким образом, N делится на 16 (т.к. делимость на 16 слагаемых $2^{25}+4^{25}+...+24^{25}$ очевидна).