

Олимпиада по математике
Муниципальный этап 2018–2019 уч. г.

7 класс

- 7.1. Три положительных числа изменили следующим образом: первое увеличили на 10%, второе – на 13%, а третье уменьшили на 20%. Больше или меньше окажется произведение трех полученных чисел по сравнению с произведением исходных?

Ответ: меньше. **Решение.** Пусть $a; b; c$ – исходные числа. Тогда $1.1a; 1.13b; 0.8c$ – полученные числа после изменения, а их произведение $(1.1 \cdot 1.13 \cdot 0.8)abc = 0.9944abc < abc$.

- 7.2. На футбольном поле встретились две команды – «Торпедо» и «Старт», по 11 человек в каждой. Средний рост игроков «Торпедо» на 2 см больше среднего роста игроков «Старта». После того, как судья удалил с поля по одному игроку каждой команды, средний рост у команд на поле сравнялся. Насколько выше удаленный игрок «Торпедо» удаленного игрока «Старта»?

Ответ: на 22 см. **Решение.** Пусть x (см) – средний рост игроков «Старта», y (см) – рост удаленного игрока «Торпедо», z (см) – рост удаленного игрока «Старта». Тогда из уравнения

(по условию задачи) $\frac{11(x+2)-y}{10} = \frac{11x-z}{10}$ получим $y-z=22$.

- 7.3. Двоечник Вова складывает дроби так: $\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{m+p}{n+q}$. а) Существуют ли

натуральные числа m, n, p, q , для которых Вовин «способ» даст правильный ответ?



б) Докажите, что для любых натуральных знаменателей n, q найдутся целые ненулевые числители m, p , для которых Вовин «способ» даст правильный ответ.

Ответ: а) не существуют. **Решение.** Домножив равенство $\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{m+p}{n+q}$ на $(n+q)nq$ и

приведя подобные члены, получим равенство $n^2p + q^2m = 0$, невозможное для натуральных чисел. Целые ненулевые числа m, p можно подобрать: например, так: $m = n^2, p = -q^2$.

- 7.4. Прямоугольник разрезали двумя перпендикулярными разрезами на четыре меньших прямоугольника. Известно, что у трех из этих маленьких прямоугольников и площадь и периметр – числа целые. Верно ли, что у четвертого прямоугольника а) периметр – целое число; б) площадь – целое число?

Ответ: а) верно; б) не верно. **Решение.** а) Пусть $ABCD$ – исходный прямоугольник и P – его периметр. Среди трех маленьких (известных) прямоугольников рассмотрим два прямоугольника, содержащие противоположные вершины исходного прямоугольника; пусть это будут вершины A и C . Периметры этих прямоугольников обозначим P_A и P_C . Тогда $P_A + P_C = P$ (это следует из сложения составляющих сторон) и, аналогично, $P_B + P_D = P$. Отсюда, четвертый прямоугольник (для определенности, содержащий вершину D) имеет периметр $P_D = P_A + P_C - P_B$, т.е. целое число. б) См. пример на рисунке. Здесь площадь трех прямоугольников равна соответственно 4; 2; 1, а площадь четвертого равна $1/2$.



- 7.5. а) Первokлассник Петя учится считать. Он хочет найти количество всех квадратов 2×2 (клетки) на шахматной доске 8×8 . Какое число у него должно получиться? б) Петя расставил произвольным образом 16 пешек на клетках доски. Могло ли оказаться так, что среди всех квадратов 2×2 (см. пункт а)) есть только один, в котором ровно одна пешка, а в остальных квадратах 2×2 – четное количество пешек (возможно, ноль)?

	×	×	×	×	×	×	×
×							
×							

Ответ: а) 49; б) могло. **Решение.** а) Квадрат 2×2 определяется положением его левой нижней вершины (узловой точки). Такая

вершина может быть любой узловой точкой квадрата 6×6 , который получится, если из квадрата 8×8 вырезать верхнюю и правую полосы шириной 2 клетки. У квадрата 6×6 , очевидно, $49 = 7^2$ узлов. б) См. пример на рисунке (крестиком отмечены клетки, где стоят пешки).