**ЗАДАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ
2018 – 2019 уч. г.**

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

11 класс

1. Найдите амплитуду изменения звездной величины Солнца, видимого с карликовой планеты Эрида. Большая полуось орбиты Эриды равна 67 а.е., а эксцентриситет – 0.44.
2. Из аэропорта Толмачево в Новосибирске рейс 178 вылетает в 10 часов утра по местному времени. В аэропорту Домодедово этот же рейс приземляется в 10 утра, но уже по московскому времени. Оцените, с какой средней скоростью летит самолет, если учесть, что города находятся на одной широте, но в разных часовых поясах. Что также может повлиять на точность вашего расчета? Длину окружности экватора Земли округлим до 40 тыс. км.
3. Известно, что вес тела на высоте h над поверхностью планеты на полюсе равен весу этого же тела на поверхности планеты на экваторе. Найти период T вращения планеты вокруг оси, если радиус планеты r , а ускорение свободного падения u поверхности на полюсе g . Планету считать однородным шаром.
4. Найти линейный размер галактики, если известно, что длины волн всех спектральных линий в спектре галактики увеличены из-за эффекта Доплера на 10 %. Угловой размер галактики составляет $1'$. Постоянную Хаббла принять равной $H = 60 \text{ км/с}\cdot\text{Мпк}$. Релятивистскими поправками пренебречь. Ответ дать в кпк. Ответ записать в виде числа, округлить до третьей значащей цифры (первой цифры перед запятой).
5. Определите светимость квазара 3C 273, имеющего видимую величину 12.8^m и красное смещение 0.158.
6. Спутник массой 2 тонны движется вокруг Солнца по эллиптической орбите с большой полуосью 2 а.е. и перигелийным расстоянием 0.5 а.е. В афелии своей орбиты он сталкивается с астероидом диаметром 1 км, движущимся по круговой орбите. Оцените в тротиловом эквиваленте энергию, выделившуюся при столкновении спутника с астероидом, считая удар абсолютно неупругим (все части спутника остались на астероиде). Энергия взрыва 1 кг тротила 4230 кДж/кг.