

10 класс

10.1. Существуют ли действительные числа x , y , удовлетворяющие уравнению $x^2 + 7y^2 + 1 = 5xy$?

Ответ: не существуют. Решение. См. задачу 9.2.

10.2. Найдите все значения параметра a , для которых уравнение

$$\sqrt{1-x^2} = ax + 2 \text{ имеет ровно один корень.}$$

Ответ: $a = \pm\sqrt{3}; |a| > 2$. Решение. Алгебраический способ

решения сводится к возведению уравнения в квадрат, приравнянию к нулю дискриминанта квадратного уравнения (это соответствует единственному корню и дает

значения $a = \pm\sqrt{3}$) и затем проверке для корней

неравенства $ax + 2 \geq 0$ (если для обоих корней неравенство выполняется, то возведение в

квадрат приводит к равносильному уравнению и, значит, есть два корня). Графический

(геометрический) способ проиллюстрирован на рисунке. Значения a , для которых прямая (с

угловым коэффициентом a) через точку $A(0;2)$ пересекает в одной точке верхнюю

полуокружность единичного радиуса с центром в O , соответствует либо касанию окружности,


либо наклону, большему (по модулю), чем наклон прямой AN (N имеет координаты $(-1;0)$),

т.е. при $|a| > 2$. Для нахождения угла между касательными $\angle MAM'$ можно заметить, что

равнобедренный треугольник BAC , описанный около данной окружности, является

равносторонним, т.к. точка O одновременно является точкой пересечения медиан (поскольку

$AO:OP = 2:1$).



10.3. В треугольнике ABC проведена медиана BM . Можно ли утверждать, что треугольник ABC равнобедренный, если известно, что а) $R_{ABM} = R_{CBM}$; б) $r_{ABM} = r_{CBM}$, где R и r – радиусы описанной и вписанной окружностей соответствующих треугольников?

Ответ: а) можно. б) можно. Решение. а) Имеем $AM = 2R_{ABM} \sin \angle ABM$,

$CM = 2R_{CBM} \sin \angle CBM$. Таким образом, из условия задачи получаем

$\sin \angle ABM = \sin \angle CBM$. Отсюда либо $\angle ABM = \angle CBM$, либо $\angle ABM = 180^\circ - \angle CBM$,

но второе невозможно, т.к. иначе $\angle B = 180^\circ$. Итак, медиана BM является и биссектрисой и,

значит, $AB = BC$. б) Поскольку площади треугольников ABM и CBM равны, то по формуле

площади через радиус вписанной окружности и полупериметр будем иметь

$S_{ABM} = p_{ABM} \cdot r_{ABM} = p_{CBM} \cdot r_{CBM} = S_{CBM}$. Отсюда $p_{ABM} = p_{CBM}$, т.е.

$AB + BM + AM = BC + BM + CM$. Значит, $AB = BC$.

10.4. а) Докажите, что если квадратный трехчлен $P(x)$ принимает целые значения при всех целых x , то все его ненулевые коэффициенты по модулю больше или равны 0.5. б) Существует ли такой многочлен пятой степени, принимающий целые значения при всех целых аргументах, у которого все коэффициенты по модулю меньше 0.05?

Ответ: б) существует. Решение. а) Пусть $P(x) = ax^2 + bx + c$. Тогда $c = P(0)$ – целое число. Подставляя $x = \pm 1$, получим, что $P(-1) + P(1) = 2a + 2c$. Значит, $2a$ – целое число, и поэтому

$|a| \geq \frac{1}{2}$. Далее, $P(1) - P(-1) = 2b$ – тоже целое число и поэтому при $b \neq 0$ получаем $|b| \geq 0.5$.

б) В качестве примера рассмотрим многочлен

$$P(x) = \frac{(x-2)(x-1)x(x+1)(x+2)}{5!} = \frac{1}{120}x(x^2-1)(x^2-4) = \frac{x^5 - 5x^3 + 4x}{120}$$

Все его коэффициенты по модулю не больше $\frac{1}{24} < 0.05$, а значения $P(n)$ при целых n

являются целыми. Это следует из того, что произведение любых n последовательных целых чисел делится на $n!$. Замечание. В данном случае можно непосредственно проверить

делимость произведения пяти последовательных чисел на 3; 5 и 8, а значит, на их произведение. Действительно, среди любых трех последовательных чисел есть кратное 3; среди любых пяти есть кратное 5; а среди любых четырех есть кратное 4; а также другое (отстоящее на два) кратное 2.

10.5. Дано число $N = 1^{25} + 2^{25} + \dots + 24^{25}$. Найдите две его последние цифры;

. Ответ: а) два нуля; **Решение.** Воспользуемся тождеством

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a+b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + \dots - ab^{2n-1} + b^{2n}) \quad (*)$$

Если взять $a=1$, $b=24$, $n=12$, то получим, что $1^{25} + 24^{25}$ делится на 25. Аналогично, сумма $2^{25} + 23^{25}$ делится на 25, и так далее: сумма вида $k^{25} + (25-k)^{25}$ для $k=1,2,\dots,12$ делится на 25. Делимость на 4 следует из того, что все слагаемые $2^{25} + 4^{25} + \dots + 24^{25}$ делятся на 4 (они делятся даже на 2^{25}), а слагаемые $(1^{25} + 3^{25}) + (5^{25} + 7^{25}) + \dots + (21^{25} + 23^{25})$ делятся на 4 в силу (*). Итак, N делится на $25 \cdot 4 = 100$.