

8 класс

- 8.1.** На футбольном поле встретились две команды – «Торпедо» и «Старт», по 11 человек в каждой. Средний рост игроков «Торпедо» на 2 см больше среднего роста игроков «Старта». После того, как судья удалил с поля по одному игроку каждой команды, средний рост у команд на поле сравнялся. Насколько выше удаленный игрок «Торпедо» удаленного игрока «Старта»??

Ответ: на 22 см. **Решение.** См. задачу 7.2.

- 8.2.** В копилке 1000 монет достоинством в 1 руб., 2 руб. и 5 руб. на общую сумму 2000 руб. Сколько в копилке монет каждого достоинства, если известно, что количество однорублевых монет – простое число?

Ответ: однорублевых монет – 3, двухрублевых – 996, пятирублевых – 1. **Решение.** Пусть монет достоинством 1 руб. – x , 2 руб. – y , 5 руб. – z . Тогда $x + y + z = 1000$ и $x + 2y + 5z = 2000$. Вычтем из второго уравнения первое, умноженное на 2. Получим $x = 3z$. Таким образом, из условия о простоте числа x следует, что $x = 3$, и значит $z = 1$. Тогда из данных уравнений получим $y = 996$.

- 8.3.** Прямоугольник разрезали двумя перпендикулярными разрезами на четыре меньших прямоугольника. Известно, что у трех из этих маленьких прямоугольников и площадь и периметр – числа целые. Верно ли, что у четвертого прямоугольника **а)** периметр – целое число; **б)** площадь – целое число

Ответ: **а)** верно; **б)** не верно. **Решение.** См. задачу 7.4

- 8.4.** **а)** Первоклассник Петя учится считать. Он хочет найти количество всех квадратов 2×2 (клетки) на шахматной доске 8×8 . Какое число у него должно получиться? **б)** Петя расставил произвольным образом 16 пешек на клетках доски. Могло ли оказаться так, что среди всех квадратов 2×2 (см. пункт а)) есть только пять, в каждом из которых ровно одна пешка, а в остальных квадратах 2×2 – четное количество пешек (возможно, ноль)?

Ответ: **а)** 49; **б)** могло. **Решение.** **а)** См. задачу 7.5а). **б)** Возможный пример см. на рисунке (крестиком отмечены клетки, на которых стоят пешки).

	x	x	x	x	x	x	
x		x	x	x	x	x	
x				x	x	x	

- 8.5.** Дан треугольник ABC , в котором $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. На стороне AC отмечена точка M такая, что $AM = BC$. Найдите $\angle MBC$.

Ответ: 20° . **Решение.** Покажем сначала, что $BM = BC$. Для этого проведем окружность радиуса, равного BC , с центром в точке B и пусть M_1 – точка пересечения этой окружности с отрезком AC (отличная от C). Докажем, что M_1 совпадает с M . Действительно, так как $\angle BM_1C = \angle BCA = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$, то по свойству внешнего угла, $\angle ABM_1 = 80^\circ - 40^\circ = 40^\circ$ и поэтому $\triangle ABM_1$ – равнобедренный: $AM_1 = BM_1 = BC$ и значит, M_1 совпадает с M . Таким образом, $\angle MBC = 180^\circ - 80^\circ - 80^\circ = 20^\circ$