

9 класс

9.1. В копилке 1000 монет достоинством в 1 руб., 2 руб. и 5 руб. на общую сумму 2000 руб. Сколько в копилке монет каждого достоинства, если известно, что количество однорублевых монет – простое число?

Ответ: однорублевых монет – 3, двухрублевых – 996, пятирублевых – 1. **Решение.** См. задачу 8.2.

9.2. Существуют ли действительные числа x , y , удовлетворяющие уравнению $x^2 + 7y^2 + 1 = 5xy$?

Ответ: не существуют. **Решение.** Если рассмотреть данное равенство как квадратное уравнение относительно неизвестного x , то его дискриминант равен $(5y)^2 - 4(7y^2 + 1) = -3y^2 - 4 < 0$ при всех y .

9.3. На координатной плоскости построена окружность с диаметром OA , где O – начало координат, а точка A имеет целые координаты $(m; n)$. Через точку A проведена прямая, пересекающая окружность в точке M так, что $\angle MAO = 15^\circ$. а) При любых ли целых m , n площадь треугольника OAM – число рациональное? б) Существуют ли нечетные m и n , для которых S_{OAM} – целое число??

Ответ: а) при любых. б) не существуют. **Решение.** а) Пусть R – радиус данной окружности, а точка P – ее центр. Тогда $MP = R = \frac{1}{2}\sqrt{m^2 + n^2}$. Угол OPM равен 30° как центральный для данного вписанного угла MAO (или как угол при вершине в равнобедренном треугольнике MPA с углами при основании 75°). Поэтому высота из точки M равна $\frac{R}{2}$ (как половина гипотенузы). Итак,

$$S_{OAM} = \frac{1}{2} \cdot (2R) \cdot \frac{R}{2} = \frac{R^2}{2} = \frac{m^2 + n^2}{8} \quad (*)$$

т.е. число рациональное. б) Если $m = 2k + 1$, $n = 2l + 1$, то в правой части формулы (*) в числителе будет число $4(k^2 + l^2 + k + l) + 2$, которое не делится на 4 (и тем более, на 8).

Замечание. Выражение для S_{OAM} можно было получить, используя для площади этого прямоугольного треугольника формулу синуса двойного угла).

9.4. Дан треугольник ABC , в котором $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. На стороне AC отмечена точка M такая, что $AM = BC$. Найдите $\angle MBC$.

Ответ: 20° . **Решение.** См. задачу 8.5.

9.5. а) Докажите, что число $N = 2^{2018} + 1$ составное; б) докажите, что N имеет не менее трех различных простых делителей.

Решение.: а) N делится на 5, что следует, например, из рассмотрения последней цифры, т.к. $2^2 + 1 = 5$ и $2^{2018} + 1 = (2^2)^{1009} + 1$ делится на $2^2 + 1$ (поскольку 1009 – число нечетное). б) Дополним N до полного квадрата: $N = 2^{2018} + 1 = 2^{2018} + 2 \cdot 2^{1009} + 1 - 2^{1010} = (2^{1009} + 1)^2 - (2^{505})^2 = (2^{1009} + 1 - 2^{505})(2^{1009} + 1 + 2^{505})$. Обозначим через A и B первый и второй сомножитель соответственно. Эти сомножители взаимно просты, т.к. их разность равна 2^{506} , а сами сомножители нечетные. Второй из сомножителей, т.е. B , делится на 5. Действительно, при делении на 5 число 2^{1009} даёт остаток 2 (т.к. 2^{1008} даёт остаток 1), и, аналогично, 2^{505} даёт остаток 2. (Удобнее это доказывать, пользуясь свойствами сравнений по модулю, но можно доказать и непосредственно, исходя из того, что 2^2 имеет вид $5k - 1$ и при умножении чисел такого вида четное количество раз получаются числа вида $5k + 1$). Число A не делится на 5, т.к. отличается от B на степень двойки.

Поэтому имеем разложение $N = A \cdot 5 \cdot \frac{B}{5}$ на три множителя, и для того, чтобы показать, что эти три множителя делятся на разные простые числа, достаточно проверить, что B не делится на 25.

Поскольку $2^{10} = 1024$ имеет вид $25k - 1$, то $2^{1000} = (2^{10})^{100}$ будет иметь вид $25k + 1$ (даёт остаток 1 при делении на 25, т.к. степень 100 четная), и поэтому $2^{1009} = 2^{1000} \cdot 512$ будет иметь вид $25k + 12$. Аналогично, 2^{505} будет иметь вид $25k + 32$. Таким, образом, при делении на 25 число B даёт остаток $12 + 32 + 1 = 45$.