

Найдена точка с минимальным потенциалом – 2 балла.

5. (10 баллов) Груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает колебания так, что в верхнем положении груза пружина не деформирована. Найти отношение средних за период значений упругой энергии пружины и кинетической энергии груза.

Ответ: Средняя за период упругая энергия в 3 раза больше средней кинетической.

Решение: Введем направленную вертикально вниз ось x с началом в положении равновесия груза, где пружина растянута на mg/k (m – масса груза, g – ускорение свободного падения, k – жесткость пружины). Колебания груза относительно этой точки описываются формулой $x = (mg/k)\cos\omega t$, где $\omega = \sqrt{k/m}$ (для краткости положим начальную фазу колебаний, которая не влияет на результат, равной нулю). Колебания скорости груза при этом описываются формулой $V_x = -(\omega mg/k)\sin\omega t$. Упругая энергия пружины

$$W_e = \frac{k(x + mg/k)^2}{2} = \frac{kx^2}{2} + mgx + \frac{(mg)^2}{2k} = \frac{3(mg)^2}{4k} + \frac{(mg)^2}{k}\cos\omega t + \frac{(mg)^2}{4k}\cos 2\omega t$$

колеблется около среднего значения

$$\langle W_e \rangle = \frac{3(mg)^2}{4k}.$$

Кинетическая энергия груза

$$W_k = \frac{mV^2}{2} = \frac{(mg)^2}{4k} - \frac{(mg)^2}{4k}\cos 2\omega t$$

колеблется около среднего значения

$$\langle W_k \rangle = \frac{(mg)^2}{4k}.$$

Таким образом, получаем $\frac{\langle W_e \rangle}{\langle W_k \rangle} = 3$.

Разбалловка: Правильно записаны колебания координаты груза при выбранном начале оси x – 2 балла.

Правильно записаны соответствующие колебания скорости груза – 1 балл.

Правильно записано выражение для потенциальной энергии пружины при выбранном начале оси x – 2 балла.

Найдено среднее значение потенциальной энергии – 2 балла.

Записано выражение для кинетической энергии груза – 1 балл.

Найдено среднее значение кинетической энергии – 2 балла.

10 класс

1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$) находилась на одинаковом удалении от точки, которую она проходила в момент $t = 0$. Считая моменты t_1 , t_2 известными, найти t_3 .

Ответ: $t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} + \sqrt{\frac{(t_1 + t_2)^2}{4} + t_1 t_2}.$

Решение: Выберем ось x в направлении скорости частицы в момент $t = 0$. Ускорение частицы направлено, очевидно, против оси x . Обозначив величину начальной скорости через V_0 , а величину ускорения через a , запишем следующие соотношения:

$$x = V_0 t_1 - \frac{at_1^2}{2}, \quad x = V_0 t_2 - \frac{at_2^2}{2}, \quad -x = V_0 t_3 - \frac{at_3^2}{2}.$$

Поделив уравнения на a и исключая из полученной системы уравнений x/a и V_0/a , приходим к квадратному уравнению для t_3 :

$$t_3^2 - (t_1 + t_2)t_3 - t_1 t_2 = 0,$$

откуда находим (после выбора положительного знака перед корнем)

$$t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} + \sqrt{\frac{(t_1 + t_2)^2}{4} + t_1 t_2}.$$

Разбалловка: Понята картина движения частицы – 2 балла.

Записаны формулы для координат частицы в моменты t_1 , t_2 и t_3 – по 1 баллу за формулу.

Получено квадратное уравнение для t_3 – 4 балла.

Получен правильный ответ – 1 балл.

2. (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?

Ответ: Камень бросили под углом 45° .

Решение: Угловая скорость ω вращения вектора линейной скорости может быть выражена через нормальное ускорение a_n и величину линейной скорости V как $\omega = a_n/V$. В верхней точке параболической траектории камня нормальное ускорение максимально ($a_n = g$), а скорость минимальна ($V = V_0 \cos \alpha$, где V_0 – начальная скорость, α – угол броска), поэтому в этой точке ω максимальна и равна $\omega_{\max} = g/(V_0 \cos \alpha)$. В точке броска (а также в конечной точке полета) нормальное ускорение минимально ($a_n = g \cos \alpha$), а скорость максимальна ($V = V_0$), поэтому в этой точке ω минимальна и равна $\omega_{\min} = g \cos \alpha / V_0$. Из условия $\omega_{\max} = 2\omega_{\min}$ находим $\cos \alpha = \sqrt{2}/2$ и $\alpha = 45^\circ$.


Разбалловка: Угловая скорость вращения вектора скорости выражена через нормальное ускорение и линейную скорость – 3 балла.

Записана максимальная угловая скорость – 3 балла.

Записана минимальная угловая скорость – 3 балла.

Найден угол броска – 1 балл.

3. (10 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани расположенного на горизонтальном столе клина той же массы. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует, угол при основании клина равен 45° . К бруску и клину во встречных направлениях приложены равные по величине горизонтальные силы F (см. рис.). Какой угол с вертикалью составляет вектор ускорения бруска? При каком значении приложенных сил вектор ускорения бруска меняет свое направление на противоположное? Ускорение свободного падения равно g .



Ответ: Вектор ускорения бруска составляет с вертикалью угол $\alpha \approx 27^\circ$, определяемый формулой $\operatorname{tg} \alpha = 1/2$. Вектор ускорения меняет свое направление на противоположное при $F = mg$.

Решение: Направим ось x горизонтально вправо и ось y вертикально вверх. Запишем II закон Ньютона в проекции на ось x для клина

$$ma_{1x} = N \frac{\sqrt{2}}{2} - F$$

и для бруска

$$ma_{2x} = F - N \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Здесь N – величина силы взаимодействия бруска и клина (силы нормальной реакции клина). Из записанных соотношений следует, что проекции ускорений клина и бруска на ось x отличаются только знаком: $a_{1x} = -a_{2x}$. Обозначим y -компоненту ускорения бруска через a_{2y} . Записывая кинематическую связь (равенство ускорений клина и бруска в проекции на перпендикулярное к наклонной грани клина направление)

$$\frac{\sqrt{2}}{2} a_{1x} = \frac{\sqrt{2}}{2} (a_{2x} - a_{2y})$$

и учитывая, что $a_{1x} = -a_{2x}$, получаем $a_{2x} = 2a_{2y}$. Угол α , который ускорение бруска составляет с вертикалью, определяется формулой $\operatorname{tg} \alpha = a_{2y}/a_{2x} = 1/2$. Если $a_{2x} > 0$ и $a_{2y} > 0$, то вектор ускорения направлен под углом α к

положительному направлению оси y . Если же $a_{2x} < 0$ и $a_{2y} < 0$, то вектор ускорения направлен под углом α к отрицательному направлению оси y . Как видно из приведенного выше уравнения II закона Ньютона для бруска, смена знака a_{2x} происходит при $F = N \frac{\sqrt{2}}{2}$. Записывая II закон Ньютона для бруска в проекции на ось y в виде

$$ma_{2y} = N \frac{\sqrt{2}}{2} - mg,$$

получаем, что смена знака a_{2y} происходит при $N \frac{\sqrt{2}}{2} = mg$. Таким образом, при $F = mg$ происходит одновременная смена знака a_{2x} и a_{2y} , т.е. смена направления вектора ускорения бруска.

Разбалловка: Расставлены векторы сил – 1 балл.

Записан II закон Ньютона для бруска в проекции на горизонталь – 1 балл.

Записан II закон Ньютона для бруска в проекции на вертикаль – 1 балл.

Записан II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь – 1 балл.

Записана кинематическая связь – 2 балла.

Найден искомый угол – 2 балла.

Найдена искомая сила – 2 балла.

4. (10 баллов) Нить с подвешенным на ней шариком отклонили на угол 30° от вертикали и отпустили. Каким будет угол отклонения нити в момент, когда вертикальная скорость шарика достигнет максимума?

Ответ: Угол определяется формулой $\cos \alpha = \frac{2 + \sqrt{15}}{6}$.

Решение: В момент достижения вертикальной скоростью шарика максимума, ускорение шарика направлено горизонтально. Отсюда следует, что вертикальная проекция силы натяжения нити T равна силе тяжести mg :

$$T \cos \alpha = mg$$

(α - угол отклонения нити в рассматриваемый момент). Из II закона Ньютона в проекции на нить следует также, что

$$\frac{mV^2}{R} = T - mg \cos \alpha$$

(здесь V – скорость шарика, а R – длина нити). Записывая дополнительно закон сохранения энергии в виде

$$\frac{mV^2}{2} = mgR \left(\cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \right),$$

сводим систему трех уравнений к квадратному уравнению

$$3 \cos^2 \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha - 1 = 0.$$

Выбирая решение этого уравнения с положительным знаком перед корнем, окончательно получаем

$$\cos \alpha = \frac{2 + \sqrt{15}}{6}.$$

Разбалловка: Записан баланс вертикальных сил – 3 балла.

Записан II закон Ньютона в проекции на нить – 2 балла.

Записан закон сохранения энергии – 2 балла.

Получено квадратное уравнение для нахождения угла – 2 балла.

Найден искомый угол – 1 балл.

5. (10 баллов) Газ находится в сосуде, в стенке которого имеется маленькое отверстие, через которое молекулы газа вылетают в вакуум. Как температура газа зависит от времени (растет, не меняется, убывает)? Теплоемкость стенок пренебрежимо мала.

Ответ: Температура газа убывает.

Решение: Молекулы газа имеют разброс по скоростям и, следовательно, по кинетическим энергиям. Температура газа – мера средней кинетической энергии молекул. За определенный промежуток времени более энергичные молекулы могут долететь до отверстия с большего расстояния. Следовательно, доля энергичных молекул среди вылетающих молекул больше, чем их доля внутри сосуда. Поэтому температура газа будет понижаться.

Разбалловка: Указано на наличие разброса по скоростям у молекул – 2 балла.

Указано, что температура является мерой средней кинетической энергии молекул – 2 балла.

Понято, что доля энергичных молекул среди вылетающих больше, чем внутри сосуда – 4 балла.

Сформулирован правильный ответ – 2 балла.

9 класс

1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$) находилась на одинаковом удалении от точки, которую она проходила в момент $t = 0$. Считая моменты t_1 , t_2 известными, найти t_3 .

Ответ: $t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} + \sqrt{\frac{(t_1 + t_2)^2}{4} + t_1 t_2}$.

Решение: Выберем ось x в направлении скорости частицы в момент $t = 0$. Ускорение частицы направлено, очевидно, против оси x . Обозначив величину начальной скорости через V_0 , а величину ускорения через a , запишем следующие соотношения:

$$x = V_0 t_1 - \frac{at_1^2}{2}, \quad x = V_0 t_2 - \frac{at_2^2}{2}, \quad -x = V_0 t_3 - \frac{at_3^2}{2}.$$

Поделив уравнения на a и исключая из полученной системы уравнений x/a и V_0/a , приходим к квадратному уравнению для t_3 :

$$t_3^2 - (t_1 + t_2)t_3 - t_1 t_2 = 0,$$

откуда находим (после выбора положительного знака перед корнем)

$$t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} + \sqrt{\frac{(t_1 + t_2)^2}{4} + t_1 t_2}.$$

Разбалловка: Понята картина движения частицы – 2 балла.

Записаны формулы для координат частицы в моменты t_1 , t_2 и t_3 – по 1 баллу за формулу.

Получено квадратное уравнение для t_3 – 4 балла.

Получен правильный ответ – 1 балл.

2. (10 баллов) Сколько времени находилось в полете брошенное вертикально вверх тело, если отношение максимальной высоты к начальной равно $9/8$ и за последнюю секунду тело пролетело половину пути?

Ответ: Тело находилось в полете 4 с.

Решение: Пусть t_1 – время подъема тела до верхней точки, t_2 – время падения от этой точки до середины пути, а g – ускорение свободного падения. Тогда

$$\frac{gt_1^2}{2} + \frac{gt_2^2}{2} = gt_2 t_3 + \frac{gt_3^2}{2}, \quad (1)$$

где $t_3 = 1$ с. Максимальную высоту подъема тела можно записать в виде $H = \frac{g(t_2 + t_3)^2}{2}$, а начальную высоту

как $h = \frac{g(t_2 + t_3)^2}{2} - \frac{gt_1^2}{2}$. Из условия $H/h = 9/8$ получаем соотношение

$$t_2 + t_3 = 3t_1. \quad (2)$$

Из системы уравнений (1) и (2) находим $t_1 = 1$ с и $t_1 = 2$ с. Таким образом, полное время полета тела равно $t_1 + t_2 + t_3 = 4$ с.