

Ответы и решения

к задачам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по физике в 2018/2019 учебном году

11 класс

1. (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?

Ответ: Камень бросили под углом 45° .

Решение: Угловая скорость ω вращения вектора линейной скорости может быть выражена через нормальное ускорение a_n и величину линейной скорости V как $\omega = a_n/V$. В верхней точке параболической траектории камня нормальное ускорение максимально ($a_n = g$), а скорость минимальна ($V = V_0 \cos \alpha$, где V_0 - начальная скорость, α - угол броска), поэтому в этой точке ω максимальна и равна $\omega_{\max} = g/(V_0 \cos \alpha)$. В точке броска (а также в конечной точке полета) нормальное ускорение минимально ($a_n = g \cos \alpha$), а скорость максимальна ($V = V_0$), поэтому в этой точке ω минимальна и равна $\omega_{\min} = g \cos \alpha / V_0$. Из условия $\omega_{\max} = 2\omega_{\min}$ находим $\cos \alpha = \sqrt{2}/2$ и $\alpha = 45^\circ$.

Разбалловка: Угловая скорость вращения вектора скорости выражена через нормальное ускорение и линейную скорость – 3 балла.
Записана максимальная угловая скорость – 3 балла.
Записана минимальная угловая скорость – 3 балла.
Найден угол броска – 1 балл.

2. (10 баллов) Брусок массы m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина с углом 45° при основании. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует. При какой массе клина он приобретет максимальную кинетическую энергию после соскальзывания бруска?

Ответ: Кинетическая энергия клина будет максимальна при массе клина $m/\sqrt{2}$.

Решение: Обозначим массу клина через M , начальную высоту бруска над столом через h , а ускорение свободного падения через g . Запишем закон сохранения энергии в виде

$$\frac{MV^2}{2} + \frac{mu^2}{2} = mgh, \quad (1)$$

где V – скорость клина, а u – скорость бруска в момент достижения бруском пола. Скорость бруска можно разложить на горизонтальную (u_h) и вертикальную компоненту (u_v), так что

$$u^2 = u_h^2 + u_v^2. \quad (2)$$

Запишем далее закон сохранения импульса в проекции на горизонтальное направление

$$MV = mu_h \quad (3)$$

и кинематическую связь (равенство скоростей клина и бруска в проекции на перпендикулярное к наклонной грани клина направление)

$$V \frac{\sqrt{2}}{2} = (u_v - u_h) \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad (4)$$

Из системы уравнений (1)-(4) выражаем кинетическую энергию клина

$$W_k = \frac{MV^2}{2} = \frac{2mgh}{3 + 2\frac{M}{m} + \frac{m}{M}}. \quad (5)$$

Выражение в знаменателе формулы (5) можно преобразовать к виду

$$3 + 2\frac{M}{m} + \frac{m}{M} = 3 + \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}M}{m} + \frac{m}{\sqrt{2}M} \right).$$

Минимальное значение выражения в скобках (а значит, максимальное значение W_k) достигается при

$$\frac{\sqrt{2}M}{m} = 1, \text{ т.е. } M = \frac{m}{\sqrt{2}}.$$

Разбалловка: Записан закон сохранения энергии – 1 балл.

Записан закон сохранения импульса – 1 балл.


Записана кинематическая связь – 4 балла.

Получена замкнутая система уравнений – 1 балл.

Из системы уравнений выражена кинетическая энергия клина – 1 балл.

Найдена масса клина – 2 балла.

3. (10 баллов) В ходе некоторого процесса 1-2-3-4 полученное идеальным одноатомным газом тепло Q и объем газа V изменялись так, как показано на рисунке (R – молярная газовая постоянная). Найти изменение внутренней энергии газа в результате процесса.



Ответ: Изменение внутренней энергии равно $-220R$.

Решение: Газ совершает процесс, состоящий из двух изобар и изохоры (см. рис.). Поскольку полное (за весь процесс) полученное газом тепло равно нулю ($Q_4 = 0$), то совершенная газом работа $A_{12} + A_{34}$ (на участке 2-3 работа не совершается) равна убыли внутренней энергии газа $U_1 - U_4$:

$$A_{12} + A_{34} = U_1 - U_4. \quad (1)$$

На изобарных участках полученное газом тепло связано с совершенной работой формулами

$$Q_{12} = \frac{5}{2} R \Delta T = \frac{5}{2} p \Delta V = \frac{5}{2} A_{12}, \quad Q_{34} = \frac{5}{2} A_{34}. \quad (2)$$

Учитывая, что $Q_{12} = Q_2 = 950R$ и $Q_{34} = -Q_3 = -400R$, находим из (1) и (2) изменение внутренней энергии

$$U_4 - U_1 = -\frac{2}{5}(Q_2 - Q_3) = -220R.$$

Разбалловка: Определен вид процесса на каждом участке – по 1 баллу.


Записан I принцип термодинамики для всего процесса – 1 балл.

Получена связь $A = (2/5)Q$ для изобарных участков – 3 балла.

Правильно найдена работа на изобарных участках – по 2 балла за участок.

Найдено изменение внутренней энергии – 1 балл.

4. (10 баллов) Положительный точечный заряд находится посередине между двумя параллельными плоскостями с равномерно нанесенными на них положительными зарядами. Поверхностные плотности заряда плоскостей отличаются в два раза. Указать точки с наибольшим и наименьшим потенциалом на окружности с диаметром, превышающим расстояние между плоскостями, и центром, совпадающим с точечным зарядом (см. рис.). Плоскость окружности перпендикулярна заряженным плоскостям.



Ответ: Искомые точки указаны на рисунке в предположении, что правая плоскость имеет большую поверхностную плотность заряда.

Решение: По принципу суперпозиции потенциал электрического поля ϕ в произвольной точке равен сумме потенциалов, создаваемых в этой точке точечным зарядом и заряженными плоскостями. Потенциал точечного заряда во всех точках окружности одинаковый. Поле заряженных плоскостей направлено от плоскости с большей плотностью заряда. Поскольку вдоль поля потенциал убывает, легко найти точки с максимальным и минимальным потенциалами.

Разбалловка: Использован принцип суперпозиции для потенциала – 1 балл.

Использован потенциал точечного заряда – 1 балл.

Использована конфигурация поля плоскостей – 2 балла.

Найдены точки с максимальным потенциалом – по 2 балла.

Найдена точка с минимальным потенциалом – 2 балла.

5. (10 баллов) Груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает колебания так, что в верхнем положении груза пружина не деформирована. Найти отношение средних за период значений упругой энергии пружины и кинетической энергии груза.

Ответ: Средняя за период упругая энергия в 3 раза больше средней кинетической.

Решение: Введем направленную вертикально вниз ось x с началом в положении равновесия груза, где пружина растянута на mg/k (m – масса груза, g – ускорение свободного падения, k – жесткость пружины). Колебания груза относительно этой точки описываются формулой $x = (mg/k)\cos\omega t$, где $\omega = \sqrt{k/m}$ (для краткости положим начальную фазу колебаний, которая не влияет на результат, равной нулю). Колебания скорости груза при этом описываются формулой $V_x = -(\omega mg/k)\sin\omega t$. Упругая энергия пружины

$$W_e = \frac{k(x + mg/k)^2}{2} = \frac{kx^2}{2} + mgx + \frac{(mg)^2}{2k} = \frac{3(mg)^2}{4k} + \frac{(mg)^2}{k}\cos\omega t + \frac{(mg)^2}{4k}\cos 2\omega t$$

колеблется около среднего значения

$$\langle W_e \rangle = \frac{3(mg)^2}{4k}.$$

Кинетическая энергия груза

$$W_k = \frac{mV^2}{2} = \frac{(mg)^2}{4k} - \frac{(mg)^2}{4k}\cos 2\omega t$$

колеблется около среднего значения

$$\langle W_k \rangle = \frac{(mg)^2}{4k}.$$

Таким образом, получаем $\frac{\langle W_e \rangle}{\langle W_k \rangle} = 3$.

Разбалловка: Правильно записаны колебания координаты груза при выбранном начале оси x – 2 балла.

Правильно записаны соответствующие колебания скорости груза – 1 балл.

Правильно записано выражение для потенциальной энергии пружины при выбранном начале оси x – 2 балла.

Найдено среднее значение потенциальной энергии – 2 балла.

Записано выражение для кинетической энергии груза – 1 балл.

Найдено среднее значение кинетической энергии – 2 балла.

10 класс

1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$) находилась на одинаковом удалении от точки, которую она проходила в момент $t = 0$. Считая моменты t_1 , t_2 известными, найти t_3 .

Ответ: $t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} + \sqrt{\frac{(t_1 + t_2)^2}{4} + t_1 t_2}$.

Решение: Выберем ось x в направлении скорости частицы в момент $t = 0$. Ускорение частицы направлено, очевидно, против оси x . Обозначив величину начальной скорости через V_0 , а величину ускорения через a , запишем следующие соотношения:

$$x = V_0 t_1 - \frac{at_1^2}{2}, \quad x = V_0 t_2 - \frac{at_2^2}{2}, \quad -x = V_0 t_3 - \frac{at_3^2}{2}.$$

Поделив уравнения на a и исключая из полученной системы уравнений x/a и V_0/a , приходим к квадратному уравнению для t_3 :

$$t_3^2 - (t_1 + t_2)t_3 - t_1 t_2 = 0,$$