

Решение: Напряжения на левых резисторах в верхней и нижней ветвях цепи равны нулю, поскольку они зашунтированы амперметрами с пренебрежимо малым сопротивлением. Следовательно, равны нулю и токи через эти резисторы. На остальных двух резисторах напряжения равны напряжению источника, и через них текут токи U/R и $U/(2R)$. Отсюда ясно, что A_3 показывает ток $U/(2R)$, A_1 – ток U/R и A_2 – ток $3U/(2R)$.

Разбалловка: Найдены токи через резисторы – по 1 баллу за каждый резистор.

Найдены токи через амперметры – по 2 балла за каждый амперметр.

8 класс

1. (10 баллов) Два автомобиля выехали одновременно: один из пункта А в пункт Б, другой – из Б в А. Автомобиль, выехавший из пункта А, в течение часа двигался со скоростью 80 км/ч, полчаса стоял, а затем двигался до пункта Б со скоростью 100 км/ч. Скорость другого автомобиля была постоянной и равной 80 км/час. Каково расстояние между пунктами А и Б, если к моменту встречи автомобили прошли равные расстояния?

Ответ: Расстояние между пунктами А и Б равно 560 км.

Решение: Пусть t – промежуток времени от конца стоянки автомобиля, выехавшего из пункта А, до момента встречи автомобилей. Тогда условие равенства пройденных автомобилями до их встречи расстояний можно записать в виде

$$80 \text{ км/ч} \cdot 1 \text{ ч} + 100 \text{ км/ч} \cdot t = 80 \text{ км/ч} \cdot (1,5 \text{ ч} + t).$$

Отсюда находим $t = 2$ ч. Расстояние между городами равно $2 \cdot 80 \text{ км/ч} \cdot 3,5 \text{ ч} = 560 \text{ км}$.

Разбалловка: Составлено уравнение для нахождения времени движения до встречи – 5 баллов.

Найдено полное время движения одного из автомобилей – 3 балла.

Найдено расстояние между городами – 2 балла.

2. (10 баллов) Два автомобиля приближаются к перекрестку по двум взаимно перпендикулярным шоссе, двигаясь с одинаковыми скоростями по 60 км/ч. В некоторый момент времени один автомобиль находился на расстоянии 2 км, а второй – на расстоянии 4 км от перекрестка. Через какое время скорость сближения автомобилей обратится в нуль?

Ответ: Через 3 мин.

Решение: Скорость сближения автомобилей обратится в нуль в тот момент, когда проекции скоростей автомобилей на линию, соединяющую автомобили, будут равны между собой. Такое положение достигается, когда один автомобиль, проехав перекресток, удалится от него на такое же расстояние, на какое другой не доедет до перекрестка. Это расстояние, очевидно, равно 1 км. При этом каждый из автомобилей проходит 3 км, затрачивая по 3 мин.

Разбалловка: Найдено положение автомобилей в момент нулевой скорости сближения – 6 баллов.

Найдены пройденные к этому моменту пути – 2 балла.

Получен ответ – 2 балла.

3. (10 баллов) Два тела равной массы и разной удельной теплоемкости имеют одинаковую температуру. Если более теплоемкому телу сообщить некоторое количество теплоты и привести его в тепловой контакт с менее теплоемким, то переданное при теплообмене тепло окажется в 1,2 раза меньше, чем в случае, когда начальное тепло сообщили бы менее теплоемкому телу. Найти отношение удельных теплоемкостей тел.

Ответ: Теплоемкости отличаются в 1,2 раза.

Решение: Обозначим через m массу каждого тела, а через C_1 и C_2 удельные теплоемкости тел ($C_1 > C_2$). Независимо от того, какому телу сообщается начальное количество теплоты Q , итоговое повышение температуры тел будет одним и тем же и равным

$$\Delta t^\circ = \frac{Q}{m(C_1 + C_2)}.$$

При сообщении начального тепла телу с теплоемкостью C_1 , повышение температуры тела с теплоемкостью C_2 обеспечивается передачей ему от первого тела количества тепла $Q_{12} = mC_2\Delta t^\circ$. При сообщении же начального тепла телу с теплоемкостью C_2 , повышение температуры тела с теплоемкостью C_1 обеспечивается пере-

дачей ему количества тепла $Q_{21} = mC_1\Delta t^\circ$ от второго тела. Очевидно, что $Q_{21} > Q_{12}$. Тогда из условия $Q_{21}/Q_{12} = 1,2$ находим $C_1/C_2 = 1,2$.

Разбалловка: Записано выражение для итогового повышения температуры тел – 4 балла.

Записано выражение для Q_{12} – 2 балла.

Записано выражение для Q_{21} – 2 балла.

Найдено отношение теплоемкостей – 2 балла.

4. (10 баллов) На дне цилиндрического сосуда с водой лежит кубик, к которому с помощью нити прикреплен полностью погруженный в воду кусок льда. Кубик плотно прилегает ко дну, так что вода под него не подтекает. На сколько изменится сила, с которой вода действует на кубик, после того, как весь лед растает? Масса льда равна 0,18 кг, площадь дна сосуда вдвое больше площади грани кубика, плотности льда и воды равны соответственно 900 кг/м^3 и 1000 кг/м^3 , ускорение свободного падения считать равным 10 м/с^2 .

Ответ: Сила уменьшится на 0,1 Н.

Решение: Уровень воды в сосуде понизится в результате таяния льда на

$$\Delta h = \left(\frac{m}{\rho_1} - \frac{m}{\rho_2} \right) \frac{1}{S},$$

где m – масса льда, ρ_1 и ρ_2 – плотности льда и воды соответственно, S – площадь дна. Из-за понижения уровня сила, с которой вода давит на кубик, уменьшится на

$$\rho_2 g \Delta h \frac{S}{2} = 0,1 \text{ Н.}$$

Здесь учтено, что площадь грани кубика равна $S/2$.

Разбалловка: Понято, что надо рассчитывать силу на верхнюю грань кубика – 3 балла.

Написано выражение для понижения уровня воды в сосуде – 4 балла.

Написано выражение для изменения силы на кубик – 2 балла.

Найден численный ответ – 1 балл.

7 класс

Ответ: Расстояние между пунктами А и Б равно 560 км.

Решение: Пусть t – промежуток времени от конца стоянки автомобиля, выехавшего из пункта А, до момента встречи автомобилей. Тогда условие равенства пройденных автомобилями до их встречи расстояний можно записать в виде

$$80 \text{ км/ч} \cdot 1 \text{ ч} + 100 \text{ км/ч} \cdot t = 80 \text{ км/ч} \cdot (1,5 \text{ ч} + t).$$


Отсюда находим $t = 2 \text{ ч}$. Расстояние между городами равно $2 \cdot 80 \text{ км/ч} \cdot 3,5 \text{ ч} = 560 \text{ км}$.

Разбалловка: Составлено уравнение для нахождения времени движения до встречи – 5 баллов.

Найдено полное время движения одного из автомобилей – 3 балла.

Найдено расстояние между городами – 2 балла.

2. (10 баллов) Семиклассник Вова отправился в лес по тропинке, вид которой приведен на рисунке. Участки тропинки АВ, ВС и CD он проходил за одинаковое время. Считая, что граница леса представляет собой прямую линию, указать, на каком из трех участков средняя скорость приближения Вовы к лесу минимальна и максимальна.



Ответ: Средняя скорость приближения к лесу максимальна на участке CD и минимальна (равна нулю) на участке BC.

Разбалловка: Понято, что при определении скорости приближения к лесу нужно рассматривать длину перпендикуляра, опущенного на границу леса – 4 балла.

Найден участок с наименьшей средней скоростью – 3 балла.

Найден участок с наибольшей средней скоростью – 3 балла.


3. (10 баллов) Из одного листа металла сделали диск радиуса 5 см и кольцо с внутренним радиусом 5 см и внешним радиусом 10 см. Найти отношение масс этих тел.

Ответ: Масса кольца в 3 раза больше массы диска.

Решение: Масса диска m_1 пропорциональна квадрату его радиуса $R_1 = 5$ см: $m_1 = kR_1^2$, где коэффициент k измеряется в кг/см^2 . Массу кольца m_2 можно представить как разность масс двух дисков радиусов 10 см и 5 см:
 $m_2 = kR_2^2 - kR_1^2 = 3kR_1^2 = 3m_1$.

Разбалловка: Понято, что масса диска пропорциональна квадрату его радиуса – 3 балла.
Масса кольца записана как разность масс двух дисков – 3 балла.
Получен ответ – 4 балла.

4. (10 баллов) Подвешенный на пружине кубик лежит на опоре (см. рис.). При этом растяжение пружины в 3 раза меньше, чем в отсутствие опоры. Во сколько раз изменится сила, с которой кубик действует на опору, если передвинуть ее в положение, при котором растяжение пружины увеличится в 1,5 раза?



Ответ: Сила уменьшится в $4/3$ раза.

Решение: В первом положении сила со стороны пружины равна $mg/3$, а сила со стороны опоры $2mg/3$ (m – масса кубика, g – ускорение свободного падения). Когда опору передвинули, сила со стороны пружины возросла 1,5 раза, т.е. стала $mg/2$. Такой же стала и сила со стороны опоры. Таким образом, сила действия опоры на кубик (и кубика на опору) уменьшится в $4/3$ раза.

Разбалловка: Найдена сила со стороны пружины в первом положении – 2 балла.
Найдена сила со стороны опоры в первом положении – 2 балла.
Найдена сила со стороны пружины во втором положении – 2 балла.
Найдена сила со стороны опоры во втором положении – 2 балла.
Получен ответ – 2 балла.

Общая рекомендация: При проверке, если задача не решена, можно давать 1-2 балла за правильно написанные физические законы, относящиеся к задаче.