

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

10 класс

1. Углеводород **A** при хлорировании на свету образует единственное монохлорпроизводное **B**, содержащее 22.98 % хлора по массе. При нитровании углеводорода **A** смесью концентрированных азотной и серной кислот получается единственное моонитропроизводное **C**.

1.1. Запишите структурные формулы веществ **A**, **B**, **C**.

1.2. Напишите уравнения указанных реакций.

(20 баллов)

2. Монету из сплава меди и серебра растворили в избытке концентрированной азотной кислоты. Полученный раствор выпарили, твердый продукт прокалили на воздухе при температуре 500 °С до постоянной массы. Масса полученного в результате этого продукта на 15 % больше массы исходной монеты.

2.1. Запишите уравнения проведенных реакций.

2.2. Рассчитайте массовые доли меди и серебра в монете.

(30 баллов)

3. Допустим, что при взрыве 2,4,6-тринитротолуола $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3$ (тротила) образуются только азот, угарный газ, водород и уголь.

3.1. Составьте уравнение реакции взрыва.

3.2. Рассчитайте максимальную массу тротила, взрыв которого не разрушит реактор объемом 0.5 л, если температура после взрыва достигает 2000 °С. Реактор выдерживает давление до 500 атм.

(20 баллов)

4. Вещество состава C_5H_{10} реагирует с бромной водой, обесцвечивает на холоду нейтральный раствор перманганата калия, образует смесь уксусной и пропионовой кислот при нагревании с кислым раствором перманганата калия, превращается в углеводород нормального строения при гидрировании на платиновом катализаторе.

4.1. Напишите структурные формулы и названия всех принципиально возможных изомеров C_5H_{10} .

4.2. Среди всех возможных изомеров C_5H_{10} выберите те, свойства которых отвечают условию задачи. Приведите рассуждения.

4.3. Запишите уравнения всех перечисленных реакций и расставьте коэффициенты.


(30 баллов)

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

10 класс
Решение заданий

Задача 1.

1.1. Уравнение хлорирования на свету углеводорода **A** в общем виде можно записать:



Молярная масса **B** по условию задачи составляет
 $M(\text{C}_x\text{H}_{y-1}\text{Cl}) = 35.5 / 0.2298 = 154.5$ г/моль.


Тогда молярная масса углеводорода **A** равна
 $M(\text{C}_x\text{H}_y) = 154.5 - 35.5 + 1 = 120$ г/моль.

Образование монохлорпроизводных в результате хлорирования на свету происходит в результате замещения водородных атомов предельных углеводородов и углеводородов с алкильными группами. Образование мононитропроизводного при действии концентрированных азотной и серной кислот происходит при замещении водородных атомов при ароматическом кольце. Следовательно, углеводород содержит ароматическое кольцо и алкильную группу.



В молекуле не может быть конденсированных ароматических колец, поскольку простейшее соединение этого класса нафталин C_{10}H_8 по молярной массе превосходит углеводород **A**. По той же причине число бензольных колец в молекуле не может быть более одного. Значит, соединение является замещенным бензолом.

Исходя из молярной массы, заключаем, что в молекуле углеводорода может находиться не более 9 углеродных атомов. Кроме того, в молекуле должно быть не менее 7 атомов углерода, чтобы являться замещенным бензолом. Среди вариантов формул **A** с молярной массой 120 г/моль C_7H_{36} , C_8H_{24} и C_9H_{12} только последний отвечает реальному соединению.

Молекула вещества **A** должна обладать высокой симметрией, на что указывает образование единственных монозамещенных продуктов галогенирования и нитрования по разным типам атомов водорода. Этим требованиям удовлетворяет единственный изомер 1,3,5-триметилбензол.



1.2. Уравнения реакций:




Рекомендации по оценке решения



За нахождение молярной массы углеводорода	5 баллов
За структурные формулы A, B, C (3 вещества) – по 3 балла	9 баллов
За написание уравнений реакций (2 уравнения) – по 3 балла	6 баллов
Всего	20 баллов

Задача 2.

2.1. При растворении монеты в концентрированной азотной кислоте протекают следующие реакции:



В растворе находятся нитраты серебра и меди. После выпаривания и прокаливании они превратятся в серебро и оксид меди:



Окончательный остаток – смесь серебра и оксида меди(II).

2.2. Пусть масса монеты x г, а масса меди в ней y г.

Тогда количество вещества меди в монете $n(\text{Cu}) = y / 64 = 0.0156y$ моль, количество вещества серебра $n(\text{Ag}) = (x - y) / 108 = 0.00926(x - y)$ моль.

По условию задачи масса остатка равна:

$$m(\text{остатка}) = 1.15x \text{ г} = m(\text{Ag}) + m(\text{CuO}) = n(\text{Ag}) \cdot M(\text{Ag}) + n(\text{CuO}) \cdot M(\text{CuO}),$$

$$m(\text{остатка}) = 0.00926(x - y) \cdot 108 + 0.0156y \cdot 80 = (x - y) + 1.25y = x + 0.25y, \\ x = 1.67y.$$

Массовая доля меди в монете равна:


$$\omega(\text{Cu}) = m(\text{Cu}) / m(\text{монеты}) = m(\text{Cu}) / [m(\text{Cu}) + m(\text{Ag})] = y / x = y / (1.67y) = \\ = 1 / 1.67 = 0.60. \text{ Тогда содержание серебра в монете } 40\%.$$

Рекомендации по оценке решения

За запись уравнений реакций (4 уравнения) – по 4 балла	16 баллов
За расчет массовых долей меди и серебра	14 баллов
Всего	30 баллов

Задача 3.

3.1. Уравнение протекающей реакции:



3.2. Пусть искомая масса тротила ($M = 227$ г/моль) равна m г, что составляет $m/227$ моль.

По уравнению реакции 2 моль тротила дают 20 моль газов, поэтому при взрыве m , г $[(m / 227), \text{ моль}]$ тротила образуется:

$$20m / (2 \cdot 227) = 10m / 227 \text{ моль газов.}$$

Из уравнения Менделеева-Клапейрона $pV = nRT$, следует, что $pV = 10mRT / 227$, откуда $m = 227pV / (10RT)$.










При $p = 500$ атм, $T = 2273$ К и $V = 0.5$ л получаем: $m = 30.4$ г.

Рекомендации по оценке решения

За запись уравнения реакции	5 баллов
За расчет массы тротила	15 баллов
Всего	20 баллов

Задача 4.

4.1. Формулы C_5H_{10} удовлетворяют изомерные алкены и циклоалканы следующего строения:



4.2. С раствором брома реагируют все приведенные соединения, кроме циклопентана (10).





Водный раствор перманганата калия на холоду обесцвечивают только алкены, то есть соединения 1-6.

При гидрировании на платиновом катализаторе только алкан нормального строения (пентан) образует пентен-1, изомерные пентены-2 (1-3) и циклопентан (10).

При нагревании с кислым раствором перманганата калия смесь уксусной и пропионовой кислот образует только пентен-2 (цис- и транс-изомеры).

Таким образом, условию удовлетворяют цис-пентен-2 и транс-пентен-2.

4.3. Уравнения реакций:



Рекомендации по оценке решения

За формулы и названия изомеров (12 веществ) – по 1 баллу	12 баллов
За выбор веществ, отвечающих условию (2 вещества) по 5 баллов	10 баллов
За уравнения реакций (4 уравнения) – по 2 балла	8 баллов
Всего	30 баллов