

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

11 класс

Я пью его в мельчайших дозах,
На сахар капаю раствор,
А он способен бросить в воздух
Любую из ближайших гор.
В.Т. Шаламов

1. Самыми известными взрывчатыми веществами являются порох и динамит. Порох представляет собой смесь измельченных кусочков угля, серы и селитры. Основу динамита составляет нитроглицерин.

При поджигании пороха выделяется смесь углекислого и угарного газов, азот, карбонат и сульфид калия. При взрыве нитроглицерина твердых продуктов не образуется; выделяются оксид углерода (IV), вода, азот и кислород.

При взрыве пороха развивается давление 6000 атм и температура 3000 °С. При взрыве нитроглицерина создаются давление 270000 атм и температура 4110 °С.

1.1. Запишите уравнения реакций взрывов.

1.2. Рассчитайте суммарные молярные концентрации газов в момент взрыва для пороха и нитроглицерина.

1.3. Напишите, как давно известны порох и динамит.

1.4. Напишите, какие компоненты, помимо нитроглицерина, содержит динамит и для какой цели они вводятся.

1.5. Напишите, чем, кроме создания динамита, еще знаменит его изобретатель.

1.6. Назовите другую область применения нитроглицерина, кроме как взрывчатого вещества.

(25 баллов)

2. Один из изомерных нонанов **А**, содержащий два четвертичных атома углерода, при фотохимическом хлорировании образует только два различных моноклорпроизводных **Б** и **В**. При нагревании их смеси с безводным хлоридом алюминия выделяется хлороводород и образуется жидкость, представляющая собой смесь двух соединений **Г** и **Д**. Данная смесь обесцвечивает бромную воду, образуя вещества **Е** и **Ж**. При каталитическом гидрировании смеси **Г** и **Д** получены соединения **З** и **И**, изомерные исходному алкану **А**.

2.1. Приведите структурные формулы соединений **A** – **И** и их названия по номенклатуре ИЮПАК.

2.2. Напишите структурные формулы промежуточных частиц, образующихся при действия хлорида алюминия на хлорпроизводные **Б** и **В**. Объясните повышенную устойчивость этих частиц.

(25 баллов)

3. Препарат «гидроперит» получается совместной кристаллизацией раствора мочевины и пероксида водорода и не содержит кристаллизационной воды. Одну таблетку гидроперита растворили в воде и добавили каталитическое количество оксида марганца (IV). Объем выделившегося газа после отделения паров воды составил 168 мл при нормальных условиях.

3.1. Запишите уравнение реакции разложения пероксида водорода.

3.2. Рассчитайте содержание компонентов гидроперита в массовых и мольных долях.

3.3. Предложите другой химический способ определения состава гидроперита. Запишите необходимые уравнения реакций.

3.4. Напишите по одной области применения гидроперита и его компонентов.

(25 баллов)



4. При взаимодействии 8.4 г алкена **A** с избытком водного раствора перманганата калия образовался осадок, масса которого после высушивания при 300 °С составила 17.4 г. Органический продукт этой реакции **В** был количественно выделен из раствора и нагрет с 66.4 г терефталевой кислоты в присутствии минеральной кислоты. В результате было получено индивидуальное высокомолекулярное соединение **С**.

4.1. Запишите структурные формулы веществ **A**, **В** и **С**.

4.2. Запишите уравнения приведенных реакций.

4.3. Рассчитайте молярную массу полученного полимера **С**.

4.4. Приведите название полимера **С** и напишите область его применения.


(25 баллов)

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

11 класс
Решение заданий


Задача 1.

1.1. В зависимости от состава пороха (как смеси веществ) его взрыв можно описать несколькими уравнениями, например:



При оценке решения любой вариант реакции с участием этих веществ и такими продуктами реакции следует считать правильным, если расставлены коэффициенты.

Взрыв нитроглицерина проходит в соответствии с уравнением:



1.2. Расчет молярных концентраций проводим по уравнению $P = CRT$, откуда $C = P/RT$. Подставляя числовые данные, получаем:

для пороха: $C = 6000 \text{ атм} / 3273\text{К} \cdot 0.082 \text{ л} \cdot \text{атм} / \text{моль} \cdot \text{К} = 22 \text{ моль/л}$.

для нитроглицерина: $C = 270000 \text{ атм} / 4383\text{К} \cdot 0.082 \text{ л} \cdot \text{атм} / \text{моль} \cdot \text{К} = 751 \text{ моль/л}$.

1.3. Древним китайцам повезло жить в местностях с почвой, богатой солями щелочных металлов, где селитра (важная составляющая пороха) встречалась в самородном виде прямо на поверхности земли. Именно китайцы изобрели порох примерно в середине 1 века н.э. Динамит был запатентован Альфредом Нобелем 25 ноября 1867 года.

При оценке работ за полный ответ можно засчитать древние времена для пороха и XIX век для динамита.

1.4. Порох сравнительно безопасен в обращении, нитроглицерин взрывается при нагревании или встряхивании. Альфред Нобель смешал маслянистый нитроглицерин с кизельгуром — рыхлым кремнеземом с остатками диатомовых водорослей (3 : 1) Кизельгур отделял частицы нитроглицерина друг от друга, и это снижало скорость их распада. Такой смеси можно было придать любую форму, она не разлагалась и не взрывалась самопроизвольно. Нобель назвал эту смесь динамитом (от греч. *dynamis* — сила).

1.5. «Изобретение динамита еще можно простить Альфреду Нобелю. Но только безусловный враг человечества мог придумать Нобелевскую премию», — пошутил однажды лауреат Нобелевской премии Бернارد Шоу. Изобретатель динамита – учредитель самой престижной научной премии, названной его именем. Будучи талантливым предпринимателем, Альфред Нобель основал десятки оружейных предприятий по всему миру, занимался нефтепереработкой (первое семейное предприятие в Баку в 1879 г.). Организовав собственную лабораторию, проводил химические опыты, синтезировав ряд известных соединений, в том числе нитроцеллюлозу.

1.6. В организме человека от нитроглицерина отщепляется молекула NO, что вызывает расширение сосудов. В виде таблеток по 0.5 мг или 1 %-ого спиртового раствора применяется при лечении заболеваний сердца, так как обеспечивает полноценный приток крови к сердцу.


Рекомендация по оценке решения

За уравнения реакций (2 уравнения) – по 3 балла	6 баллов
За расчет молярных концентраций (2 расчета) – по 4 балла	8 баллов
За датировку изобретений (2 продукта) – по 2 балла	4 балла
За раскрытие состава динамита	5 баллов
За любое другое достижение А.Нобеля	1 балл
За лекарственные свойства нитроглицерина	1 балл
Всего	25 баллов


Задача 2.

2.1. Формулы и названия веществ.

Исходное соединение А – **2,2,4,4-тетраметилпентан**, продукты его фотохимического хлорирования - **Б - 2,2,4,4-тетраметил-1-хлорпентан** и **В - 2,2,4,4-тетраметил-3-хлорпентан**.




Действие хлорида алюминия приводит к образованию карбокатионов:




Первоначально образующиеся карбокатионы претерпевают перегруппировку, превращаясь в более устойчивые – третичные.

Жидкость, обесцвечивающая бромную воду, – смесь алкенов Г и Д. Последние получают при отщеплении от катионов иона водорода. Процесс проходит по правилу Зайцева.




Г - 2,2,4-триметилгексен-3 или 3,5,5-триметилгексен-2




Д - 2,3,4,4-тетраметилпентен-2


Реакция с бромной водой:



Е - 3,4-дибром-2,2,4-триметилгексан





Или Е - 2,3-дибром-3,5,5-триметилгексан



Ж - 2,3-дибром-2,3,4,4-тетраметилпентан

Гидрирование:



И - 2,2,3,4-тетраметилпентан

2.2. Формулы промежуточных частиц – карбокатионов – даны выше.


Устойчивость алкильных карбокатионов зависит от электронных эффектов заместителей при положительно заряженном углероде: все заместители, обладающие положительным индукционным эффектом (+I) – стабилизируют карбокатион. Устойчивость алкильных карбокатионов убывает в ряду: $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ (третичный) > $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$ (вторичный) > первичный C_2H_5^+ > метильный CH_3^+ . В нашем случае перегруппировки способствуют превращению первичного и вторичного карбокатионов в более устойчивый третичный.

Рекомендация по оценке решения

За структурные формулы А – И (9 веществ) – по 1 баллу	9 баллов
За названия веществ А – И (9 веществ) – по 1 баллу	9 баллов
За формулы третичных карбокатионов (2 формулы)	4 балла
За объяснение устойчивости карбокатионов	3 балла
Всего	25 баллов

Задача 3.

3.1. Разложение пероксида водорода описывается уравнением



3.2. Количество вещества выделившегося кислорода

$0.168 \text{ л} / 22.4 \text{ л/моль} = 0.0075 \text{ моль}$, следовательно,

количество вещества H_2O_2 составляет $2 \cdot 0.0075 = 0.015 \text{ моль}$.

Масса H_2O_2 $0.015 \text{ моль} \cdot 34 \text{ г/моль} = 0.51 \text{ г}$.

Согласно надписи на упаковке, масса таблетки 1.5 г, следовательно,

массовая доля $\omega(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.51 \text{ г} / 1.5 \text{ г} = 0.34$ (34 %),

массовая доля $\omega((\text{NH}_2)_2\text{CO}) = 1 - 0.34 = 0.66$ (66 %).

Масса мочевины $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ в одной таблетке $1.5 - 0.51 = 0.99 \text{ г}$.

Количество вещества мочевины $0.99 \text{ г} / 60 \text{ г/моль} = 0.0165 \text{ моль}$.

Количество вещества H_2O_2 найдено выше равным 0.015 моль .

Мольные доли составляют:

для мочевины $0.0165 / (0.0165 + 0.015) = 0.52 \text{ (52 \%)}$,

для пероксида водорода $0.015 / (0.0165 + 0.015) = 0.48 \text{ (48 \%)}$.


3.3. Количественное определение пероксида водорода можно проводить йодометрическим или перманганатометрическим титрованием.

Взаимодействие пероксида водорода с перманганатом калия в кислой среде описывается следующим уравнением:




Перманганат калия обесцвечивается при добавлении к раствору пероксида водорода. Титрование заканчивают в момент окрашивания раствора.

Для реализации второго метода к раствору, содержащему пероксид водорода, добавляют избыток KI в сернокислой среде:



Выделяющийся йод титруют тиосульфатом натрия до обесцвечивания раствора (индикатор - крахмал):



3.4. Области применения гидроперита, мочевины и пероксида водорода.

Медицина. Гидроперит и пероксид водорода применяют в медицине как антисептическое и кровоостанавливающее средство. Мочевина применяется в медицине в качестве мочегонного средства и для лечения заболеваний, связанных с сухостью кожи. Входит в состав косметических средств для сухой кожи.

Сельское хозяйство. Мочевина (карбамид) используют в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

Экспериментальная химия. Пероксид водорода в экспериментальной химии используют в качестве окислителя.


Сфера услуг. Гидроперит и пероксид водорода применяют для обесцвечивания волос.

Рекомендация по оценке решения

За е уравнения реакции разложения пероксида водорода	4 балла
За расчет количества вещества пероксида водорода	3 баллов
За расчет массовых долей компонентов	4 балла
За расчет мольных долей компонентов	4 балла
За иной способ определения состава гидроперита	4 балла
За уравнения реакций, на которых основано определение компонентов гидроперита (один комплект уравнений)	3 балла
За область применения гидроперита, пероксида водорода и мочевины – по 1 баллу	3 балла
Всего	25 баллов

Задача 4.


4.1. Окисление алкенов водным раствором перманганата калия описывается уравнением:



Осадок после высушивания – диоксид марганца. Он получен в количестве $17.4 \text{ г} / 87 \text{ г/моль} = 0.2 \text{ моль}$. При этом должно было израсходоваться 0.3 моль алкена согласно уравнению реакции, или 8.4 г алкена по условию задачи. Тогда молярная масса алкена $8.4 \text{ г} / 0.3 \text{ моль} = 28 \text{ г/моль}$, что соответствует только этилену $CH_2=CH_2$ (вещество А).

Органический продукт реакции В – этиленгликоль $HO-CH_2-CH_2-OH$ – получен в количестве 0.3 моль соответственно израсходованному алкену.

Количество вещества терефталевой кислоты – 0.4 моль . Он находится в избытке по отношению к этиленгликолю для реакции образования полимера С – полиэтилентерефталата (ПЭТ):



4.2. Уравнения реакций приведены выше.

4.3. При имеющемся соотношении реагентов (0.3 моль этиленгликоля и 0.4 моль терефталевой кислоты) в составе макромолекулы окажутся три звена этилена и четыре звена терефталата, два из которых будут концевыми группами макромолекулы.

В результате реакции выделится 0.6 моль воды (по одной молекуле воды при соединении каждого из звеньев) и образуется 0.1 моль полимера.

Масса этиленгликоля $0.3 \text{ моль} \cdot 62 \text{ г/моль} = 18.6 \text{ г}$.

Масса выделившейся воды $0.6 \text{ моль} \cdot 18 \text{ г/моль} = 10.8 \text{ г}$.

Масса полимера равна сумме масс исходных веществ за вычетом массы воды, а именно $66.4 + 18.6 - 10.8 = 74.2 \text{ г}$. Молярная масса полимера $74.2 \text{ г} / 0.1 \text{ моль} = 742 \text{ г/моль}$.

4.4. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) используют для изготовления пластиковых емкостей (бутылок) различной формы и волокон.

Рекомендация по оценке решения задачи

За определение веществ А, В и С – по 2 балла	6 баллов
За уравнение реакции алкена с перманганатом калия	4 балла
За уравнение поликонденсации	4 балла
За расчет молярной массы полимера	8 баллов
За область применения полимера С	3 балла
Всего	25 баллов