Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

9 класс

1. Для обозначения веществ и их смесей используются исторически сложившиеся тривиальные названия. Например, водные растворы некоторых веществ получили названия: соляная кислота, плавиковая кислота, синильная кислота, азотистоводородная кислота, роданистоводородная кислота.

1.1. Напишите формулы веществ, водными растворами которых являются перечисленные кислоты.

1.2. Напишите уравнения реакций нейтрализации этих кислот гидроксидом натрия. Приведите названия получившихся веществ.

(25 баллов)

2. Рассмотрите цепочку превращений веществ ***A*** – ***E***, содержащих атомы углерода и кислорода.

$$A \xrightarrow{NaOH\,(недостаток)} B \xrightarrow{NaOH\,(избыток)} C \longrightarrow$$

$$\xrightarrow{C(кокс),\,1000\,^0C} D \xrightarrow{NaOH,\,150\,^0C,\,15\,атм} E \xrightarrow{O_2} A + C$$

2.1. Установите химические формулы веществ ***A*** – ***E***.

2.2. Запишите уравнения приведенных реакций.

(20 баллов)

3. Образец кристаллического кремния массой 3.5 г, содержащий примесь диоксида кремния, при взаимодействии с избытком расплава гидроксида натрия выделяет 4.48 л (при н.у.) бесцветного газа, который в два раза легче гелия.

3.1. Запишите уравнения химических реакций взаимодействия кремния и диоксида кремния с избытком расплава гидроксида натрия.

3.2. Рассчитайте массовую долю примеси диоксида кремния в образце.

(25 баллов)

4. Синтез аммиака осуществляют взаимодействием азота и водорода по схеме:

$$N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3.$$

Исходная смесь содержала азот и водород в мольном соотношении 1 : 3. К моменту достижения равновесия молярная масса газовой смеси увеличилась на 10 %.

Рассчитайте степень превращения азота в аммиак.

(30 баллов)

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный (районный) этап

9 класс
Решение заданий

Задача 1.

1.1. Формулы растворенных веществ:
соляная кислота HCl
плавиковая кислота HF
синильная кислота HCN
азотистоводородная кислота HN_3
роданистоводородная кислота $HSCN$.

1.2. Реакции нейтрализации и названия продуктов:

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ хлорид натрия
$HF + NaOH \rightarrow NaF + H_2O$ фторид натрия
$HCN + NaOH \rightarrow NaCN + H_2O$ цианид натрия
$HN_3 + NaOH \rightarrow NaN_3 + H_2O$ азид натрия
$HSCN + NaOH \rightarrow NaNCS + H_2O$ роданид натрия

Задача 2.

2.1. Формулы веществ:
A – CO_2, **B** – $NaHCO_3$, **C** – Na_2CO_3, **D** – CO, **E** – $HCOONa$.
2.2. Уравнения реакций:

$CO_2 + NaOH \rightarrow NaHCO_3$
$NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
$Na_2CO_3 + 2C \rightarrow 2Na + 3CO$
$CO + NaOH \rightarrow HCOONa$
$2HCOONa + O_2 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

Задача 3.

3.1. Уравнения реакций:

$$Si + 4NaOH \rightarrow Na_4SiO_4 + 2H_2,$$
$$SiO_2 + 4NaOH \rightarrow Na_4SiO_4 + 2H_2O.$$

Молярная масса выделившегося газа M(газа) = M(He)/2 = 4 г/моль/2 = 2 г/моль.

$$n(H_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{4.48\ л}{22.4\ л/моль} = 0.2\ моль$$

$$n(Si) = \frac{1}{2}n(H_2) = \frac{1}{2}0.2\ моль = 0.1\ моль$$

$$m(Si) = n(Si) \times M(Si) = 0.1\ моль \times 28\ г/моль = 2.8\ г$$

$$m(SiO_2) = m(образца) - m(Si) = 3.5\ г - 2.8\ г = 0.7\ г$$

$$\omega(SiO_2) = \frac{m(SiO_2)}{m(образца)} = \frac{0.7\ г}{3.5\ г} = 0.2\ (20\ \%)$$

Задача 4.

Уравнение реакции:

$$N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3.$$

Определим молекулярную массу исходной смеси, приняв количество вещества азота 1 моль, а водорода – 3 моль.

$$M(исходной\ смеси) = x(N_2) \times M(N_2) + x(H_2) \times M(H_2) = \frac{1}{4}28г/моль + \frac{3}{4}2г/моль = 8.5\ г/моль$$

После протекания реакции молярная масса возросла на 10 % и составила

$$M(смеси) = 1.1M(исходной\ смеси) = 8.5\ г/моль \times 1.1 = 9.35\ г/моль$$

Рассчитаем выход продукта, приняв, что от исходного количества азота реагирует x моль. Тогда осталось азота $(1-x)$ моль, а водорода прореагировало $3x$, и его осталось $(3-3x)$ моль. Образовалось аммиака $2x$ моль. Составим уравнение для расчета молярной массы образовавшейся газовой смеси.

$$M(газовой\ смеси) = x(N_2) \times M(N_2) + x(H_2) \times M(H_2) + x(NH_3) \times M(NH_3) =$$

$$\frac{1-x}{(1-x)+(3-3x)+2x} \cdot 28\ г/моль + \frac{3-3x}{(1-x)+(3-3x)+2x} \cdot 2\ г/моль + \frac{2x}{(1-x)+(3-3x)+2x} \cdot 17\ г/моль =$$

$$= \frac{1-x}{4-2x} \cdot 28\ г/моль + \frac{3-3x}{4-2x} \cdot 2\ г/моль + \frac{2x}{4-2x} \cdot 17\ г/моль =$$

$$= \frac{28-28x+6-6x+34x}{4-2x} = \frac{34}{4-2x}$$

Приравняв это выражение вычисленной ранее молярной массе смеси, найдем значение x.

$$\frac{34}{4-2x} = 9.35, \quad откуда \quad x = 0.182\ моль$$

Степень превращения азота $\eta = \frac{0.182\ моль}{1\ моль} = 0.182,\ или\ 18.2\%.$

Рекомендации по оценке решения

Задача 1	
За формулы веществ (5 формул) – по 2 балла	10 баллов
За уравнения реакций (5 уравнений) – по 1 баллу	5 баллов
За названия солей (5 названий) – по 2 балла	10 баллов
Итого	**25 баллов**
Задача 2	
За установление природы веществ А – Е (5 веществ) – по 3 балла	15 баллов
За уравнения реакций (5 уравнений) – по 1 баллу	5 баллов
Итого	**20 баллов**
Задача 3	
За уравнения реакций (2 уравнения) – по 3 балла	6 баллов
За расчет молярной массы газа из плотности	4 балла
За расчет количества вещества водорода	5 баллов
За расчет массы кремния	5 баллов
За расчет массовой доли диоксида кремния	5 баллов
Итого	**25 баллов**
Задача 4	
За расчет молярной массы исходной смеси	6 баллов
За расчет молекулярной массы равновесной смеси	4 балла
За расчет количества прореагировавшего азота	15 баллов
За расчет степени превращения азота	5 баллов
Итого	**30 баллов**