


1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$) находилась на одинаковом удалении от точки, которую она проходила в момент $t = 0$. Считая моменты t_1 , t_2 известными, найти t_3 .

2. (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?

3. (10 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани расположенного на горизонтальном столе клина той же массы. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует, угол при основании клина равен 45° . К бруску и клину во встречных направлениях приложены равные по величине горизонтальные силы F (см. рис.). Какой угол с вертикалью составляет вектор ускорения бруска? При каком значении приложенных сил вектор ускорения бруска меняет свое направление на противоположное? Ускорение свободного падения равно g .



4. (10 баллов) Нить с подвешенным на ней шариком отклонили на угол 30° от вертикали и отпустили. Каким будет угол отклонения нити в момент, когда вертикальная скорость шарика достигнет максимума?


5. (10 баллов) Газ находится в сосуде, в стенке которого имеется маленькое отверстие, через которое молекулы газа вылетают в вакуум. Как температура газа зависит от времени (растет, не меняется, убывает)? Теплоемкость стенок пренебрежимо мала.

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.

1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 ($0 < t_1 < t_2 < t_3$) находилась на одинаковом удалении от точки, которую она проходила в момент $t = 0$. Считая моменты t_1 , t_2 известными, найти t_3 .

2. (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?

3. (10 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани расположенного на горизонтальном столе клина той же массы. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует, угол при основании клина равен 45° . К бруску и клину во встречных направлениях приложены равные по величине горизонтальные силы F (см. рис.). Какой угол с вертикалью составляет вектор ускорения бруска? При каком значении приложенных сил вектор ускорения бруска меняет свое направление на противоположное? Ускорение свободного падения равно g .



4. (10 баллов) Нить с подвешенным на ней шариком отклонили на угол 30° от вертикали и отпустили. Каким будет угол отклонения нити в момент, когда вертикальная скорость шарика достигнет максимума?

5. (10 баллов) Газ находится в сосуде, в стенке которого имеется маленькое отверстие, через которое молекулы газа вылетают в вакуум. Как температура газа зависит от времени (растет, не меняется, убывает)? Теплоемкость стенок пренебрежимо мала.

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.